

Γενικό πρόγραμμα εφαρμογής στις επιτραπέζιες ελιές με προϊόντα AgriLife



Ανάπτυξη ταξιανθιών

F Κρόκιασμα G

Άνθιση H

Καρπόδεση I

**Έναρξη
Βλάστησης**

Προ άνθιση

Έναρξη άνθισης

Άνθιση

Ανάπτυξη καρπού

Ωρίμανση

**μετά την
συγκομιδή**

Symbio 1

Δόση 0,2%

Derma 0,2%

7-10 ημέρες.

AgriBoom

0.25%

ή **Somguard**

0,3-0,5 %

Symbio 2

Δόση 0,1%

το καθένα

Azama 0,2%

Και

AgriBoom

0.20% ή

Bindou

0,010%

Symbio 2

Δόση 0,1%

το καθένα.

Marathon 7

0,1% κάθε

Bindou 0,01%.

Για έντομα ασθένειες.

AgriBoom 0.25%

Symbio 1

Δόση 0,1%

Azama 0,25%

Lesino 0.15%

Bindou

0,01%.

Derma 0,25%

Symbio 1 0,1%

AgriBoom

0.25%

Bindou 0,01%.

Καρπόδεση μέγεθος.

Marathon 7

0,2% **Bindou**

0,01%.

Για ασθένειες