

Γενικό πρόγραμμα εφαρμογής στα εσπεριδοειδή με προϊόντα AgriLife



**Έναρξη
Βλάστησης**

Προ άνθιση

Έναρξη άνθισης

Άνθιση

Ανάπτυξη

**Αλλαγή
χρώματος**

**Ωρίμανση
καρπού**

Symbio 1

Δόση 0,2%

Derma 0,2%

7-10 ημέρες.

AgriBoom

0.25%

ή **Somguard**

0,3-0,5 %

Somguard

0,3-0,5 % μετά
5-6 ημέρες να
γίνει εμβολιασμός.

Από το έδαφος

Oxyrich

0,5-1,5Kg/στρ

Marathon 7

Symbio 1

Δόση 0,1%

το καθένα

Derma 0,2%

Και

AgriBoom

0.20% ή

Bindou

0,010%

Symbio 2

Δόση 0,1%

το καθένα.

Marathon 7

0,1% κάθε

Bindou 0,01%.

Για έντομα ασθένειες.

AgriBoom 0.25%

Symbio 1

Δόση 0,1%

Azama 0,25%

Lesino 0.15%

Bindou

0,01%.

Derma 0,25%

Symbio 2 0,1%

AgriBoom

0.25%

Bindou 0,01%.

Καρπόδεση μέγεθος.

Symbio 2

Δόση 0,1%

Azama 0,25%

ημέρες **Bindou**

0,010%.

ή **AgriBoom**

0.25%